

## Dénomination du médicament

**MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé**  
**Chlorure de benzalkonium/Digluconate de chlorhexidine**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?
3. Comment utiliser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique antiseptiques et désinfectants : biguanides et amidines - code ATC : D08AC52

Ce médicament est un antiseptique. Il est utilisé pour l'antisepsie et le nettoyage des petites plaies superficielles.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

**N'utilisez jamais MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé :**

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous êtes allergique à un autre antiseptique de la même famille que ce médicament.
- dans les yeux ou les oreilles.
- pour désinfecter du matériel médico-chirurgical.

### Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé.

Ce médicament est réservé à l'usage externe.

En cas d'utilisation sur une grande surface, sous un pansement occlusif (imperméable à l'eau et à l'air), sur une peau profondément brûlée, une peau de prématuré ou de nourrisson, il existe des risques de passage dans la circulation générale.

### Enfants

Utiliser avec précaution chez les nouveau-nés, particulièrement les prématurés. MERCRYLSPRAY, peut provoquer des brûlures chimiques cutanées.

### Autres médicaments et MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

- MERCRYLSPRAY ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques, car ensemble ils risquent d'irriter votre peau ou d'être moins efficaces.
- Si vous utilisez du savon, rincez soigneusement avant d'appliquer MERCRYLSPRAY.

### MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé avec des aliments et boissons

Sans objet.

### Grossesse et allaitement

Ne pas appliquer la solution sur les seins pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Sans objet.

## 3. COMMENT UTILISER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé s'utilise 1 ou 2 fois par jour, pendant 7 à 10 jours.  
L'application doit durer au moins une minute, pour laisser agir le médicament.  
Pulvériser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé sur la zone à traiter.

NE PAS AVALER

**Si vous avez utilisé plus de MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé que vous n’auriez dû**  
Sans objet.  
**Si vous oubliez d’utiliser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé**  
Sans objet.  
**Si vous arrêtez d’utiliser MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé**  
Sans objet.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Possibilité d'eczéma de contact (rougeur et démangeaison) en raison de la présence de chlorure de benzalkonium.
- Brûlures chimiques chez des nouveau-nés (fréquence inconnue).

#### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.  
En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.  
N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon.  
Récipient sous pression : à protéger des rayons du soleil et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage.  
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé

- Les substances actives sont :

Chlorure de benzalkonium.....	0,500 g
Sous forme de solution de chlorure de benzalkonium.....	0,985 g
Digluconate de chlorhexidine.....	0,200 g
Sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine.....	1,065 g
Pour 100 ml.	

- Les autres composants sont :

L'acide citrique monohydraté, le citrate de sodium, l'eau purifiée.  
Gaz pulseur : azote.

##### Qu’est-ce que MERCRYLSPRAY, solution pour application cutanée en flacon pressurisé et contenu de l’emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de solution pour application cutanée en flacon pressurisé.  
Boîte de 1 flacon de 50 ml.

##### Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché

**MENARINI FRANCE**  
1-7, RUE DU JURA  
94633 RUNGIS CEDEX

##### Exploitant de l’autorisation de mise sur le marché

**MENARINI FRANCE**  
1-7, RUE DU JURA  
94633 RUNGIS CEDEX

##### Fabricant

**LABORATOIRES CHEMINEAU**  
93 ROUTE DE MONNAIE  
37210 VOUVRAY

##### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

##### La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).